

Pieaugušo vakcinācija pret difteriju un stingumkrampjiem

1. To pieaugušo pamatvakcinācija pret difteriju un stinguma krampjiem, kas nav vakcinēti pret difteriju un stinguma krampjiem

Deva		Intervāls starp vakcinācijām
Pamatvakcinācija	1.deva (Td)*	Pirmajā ārstniecības personas apmeklējuma reizē
	2.deva (Td)	1-1,5 mēnešus pēc pirmās devas ievadīšanas
	3.deva (Td)	6-12 mēnešus pēc otrās devas ievadīšanas
Pirmā balstvakcinācija		5 gadus pēc pamatvakcinācijas
Otrā un nākamā balstvakcinācija (Td)		Skat. 2.shēmu

2. To pieaugušo balstvakcinācija** pret difteriju un stinguma krampjiem, kuriem agrāk tika veikts pilns plānveida vakcinācijas kurss*** pret difteriju un stinguma krampjiem

Laika periods pēc pēdējās balstvakcinācijas	Indikācijas vakcinācijai	Vakcīna
< 1 gads	Balstvakcinācija nav nepieciešama	-
1-4 gadi	Ieteicama šādu riska grupu personu balstvakcinācija: 1) jauniešiem, iestājoties militārajā dienestā; 2) reflektanti, iestājoties medicīnas, iekšlietu un militārā profila mācību iestādēs; 3) kontaktpersonas difterijas perēkļos	Td (viena deva)
5-9 gadi	Ieteicama šādu riska grupu balstvakcinācija: 1) personas, kas atrodas slēgtos kolektīvos (piemēram, psihoneiroloģiskajās nodaļās vai pansionātos, rehabilitācijas un sociālās aprūpes iestādēs, Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībās, ieslodzījuma vietās, patversmēs); 2) ārstniecības personas un ārstniecības iestāžu apkalpojošais personāls, epidemiologi; 3) izglītības un audzināšanas iestāžu pedagogi un apkalpojošais personāls; 4) personas, kas strādā apkalpojošā sfērā (pārdevēji, sabiedriskā transporta konduktori, kontrolieri un vadītāji, kā arī citas personas, kas bieži kontaktējas ar klientiem); 5) policijas iestāžu operatīvie darbinieki; 6) personas ar alkohola, narkotisko un citu apreibinošu vielu atkarību	Td (viena deva)
10 gadi	Veicama balstvakcinācija personām, kuras nepieder riska grupām	Td (viena deva)
Ilgāk par 10 gadiem	Veicama balstvakcinācija	Td (divas devas ar intervālu 1-1,5 mēneši)

Piezīmes.

1. * Td - difterijas un stinguma krampju toksoids ar samazinātu difterijas toksoīda daudzumu.

2. ** Balstvakcinācija (revakcinācija, bustervakcinācija) — atkārtota vakcīnu ievadīšana, lai, stimulējot imunoloģiskās atmiņas mehānismu, palielinātu specifisko antivielu līmeni.

3. *** Pilns plānveida vakcinācijas kurss — visas saņemtās difterijas un stinguma krampju toksoīda devas atbilstoši vakcinācijas kalendāram (vecumam).